

10/05/2020

Confinement strict, surcharge hospitalière et surmortalité

*Analyse statistique et étude
mathématique de l'épidémie de
« Covid 19 »*



Gilles PECH de LACLAUSE, Arnaud DELENDRA

Table des matières

Résumé.....	1
1. Introduction	2
2. Méthodologie.....	2
3. Résultats.....	3
3.1 Surmortalité	4
3.2 Campagnes de dépistage et cas positifs	5
3.3 Mortalité.....	7
4. Discussion.....	10
4.1 Analyse statistique : Quelle modélisation pour quels résultats réels ?	10
4.1.1 La Belgique.....	12
4.1.2 La Suède.....	14
4.2 Les erreurs de méthode	16
4.3 Analyse mathématique : un effet pervers sur le taux de guérison	20
5. Conclusion.....	22
Bibliographie	25

Résumé

Cette étude observe les résultats de la propagation épidémique et de la mortalité dans trois pays comparables touchés assez largement. Elle utilise ensuite un modèle SEIR simple pour démontrer que les scénarios prédictifs ne sont pas pertinents dans l'utilisation qui en a été faite. Qu'ils ne se vérifient pas en réalité (cas de la Suède). Nous démontrons ensuite que l'hypothèse que les NPI « Non Pharmaceutical Interventions » au sens de l'OMS aurait un impact direct sur l'indicateur R (nombre reproducteur de base) de propagation épidémique est erronée. Et formule enfin l'hypothèse mathématique d'un effet pervers indésirable dans le cas des NPI les plus strictes, créant asymptotiquement une surcharge de la capacité hospitalière et une surmortalité.

1. Introduction

Les mesures de distanciation, d'isolement et de confinement pour gérer le développement d'une pandémie sont au sens de l'OMS des « NPI » pour « non pharmaceutical intervention » : elles ne relèvent pas du médical, mais de la liberté publique et des politiques de santé publique. Leur efficacité s'analyse aisément par les chiffres, les statistiques et peut s'expliquer ou se prévoir par les modèles mathématiques. Elles entrent ainsi dans de nombreux champs des sciences humaines ; économie, sociologie, anthropologie, psychologie sociale, etc. On peut dire que ces mesures « non pharmaceutiques » appartiennent au contrat social entre les citoyens et l'Etat.

Nous ne sommes pas qualifiés pour donner les explications en épidémiologie, virologie, immunologie ou infectiologie aux phénomènes observés. Nous incitons à la prudence. Même si nous critiquons certaines mesures, nous ne jetons de pierre à personne ; et certainement pas aux dirigeants politiques, ces mesures ayant été largement plébiscitées par les populations et une grande partie de la communauté scientifique.

2. Méthodologie

Cette étude se focalise sur les effets indésirables de la seule mesure de « hard lock down » ou confinement strict coercitif avec un gel des libertés publiques.

Pour la rendre lisible nous comparons 3 pays : La Belgique, les Pays-Bas et la Suède. Ces pays ont connu 3 niveaux de NPI différents de la plus stricte (Belgique) à la plus souple (Suède) avec un niveau intermédiaire (Pays-Bas). A titre illustratif nous ajoutons la France. Nous excluons les pays qui ont pratiqué d'autres mesures telles que des campagnes massives de dépistage avec mises en quarantaines ciblées (i.e. Allemagne, Autriche)

Il est tentant de comparer la densité de population de la Suède à celles des autres pays européens. Mais la majorité de la population suédoise est concentrée sur la bande côtière entre Stockholm et Malmö. 1/3 des suédois vivent dans les zones densément urbanisées de Stockholm, Göteborg et Malmö. La région de Göteborg (Vastra Gotaland) est frontalière d'Oslo et du comté de Viken en Norvège, et celle de Malmö (Scanie) est frontalière de la région capitale du Danemark (Copenhague).

Il est séduisant aussi de comparer la Suède à ses trois voisins scandinaves qui ont opéré des NPI plus strictes et ont connu un bilan léger et remettre en cause la politique suédoise. Mais en descendant d'un niveau national au niveau local, on observe les résultats suivants :

Pays	Région	habitants	cas	ratio
Suède	Scanie	1 362 000	1 026	0,08%
Danemark	Région capitale	1 846 023	5 041	0,27%
Suède	Vastra Gotaland	1 710 000	3 378	0,20%
Norvège	Viken	1 213 354	2 087	0,17%
Norvège	Oslo	1 588 457	2 543	0,16%

On observe que la Scanie suédoise non confinée est moins touchée que la capitale danoise voisine aux NPI plus strictes. Pourtant, chaque jour, 30 000 habitants franchissent le pont de Malmö pour aller travailler au Danemark. Certaines régions de Scandinavie ont été simplement, à ce jour, moins touchées par l'épidémie. Pourtant, la Scandinavie et sa météo d'un printemps sec et frais aurait due connaître une propagation importante [16]

Ce phénomène s'observe partout en Europe dont certaines régions sont plus touchées que d'autres. Dans de futures études sans doute faudra-t-il comparer région par région en Europe.

3. Résultats

Présentation du panel

Belgique

<u>Population</u> :	12 millions
<u>PIB Habitant 2018</u> en Standard de Pouvoir d'Achat (SPA) :	118
<u>Lits hospitaliers</u> par habitants 2018 :	5,6
<u>Lits en réanimation</u> en début de crise :	2000
<u>Système de santé</u> :	public
<u>NPI</u> : « lock down » Confinement strict et coercitif, isolement social.	

Pays-Bas

<u>Population</u> :	18 millions
<u>PIB Habitant 2018</u> en Standard de Pouvoir d'Achat (SPA) :	130
<u>Lits hospitaliers</u> par habitants 2018 :	3,3
<u>Lits en réanimation</u> en début de crise :	1150
<u>Système de santé</u> :	privé

NPI : « Shut down » Confinement souple et non coercitif (shut down) : fermeture des bars et restaurants, commerces ouverts, distanciation sociale.

Suède

<u>Population</u> :	11 millions
<u>PIB Habitant 2018</u> en Standard de Pouvoir d'Achat (SPA) :	121
<u>Lits hospitaliers</u> par habitants 2018 :	2,2
<u>Lits en réanimation</u> en début de crise :	540 => 1090
<u>Système de santé</u> :	public

NPI : « social distancing » pas de port du masque, restaurants et bars ouverts, écoles ouvertes, rassemblement interdits (50 pax), lycée et universités fermées, musées et grands centres de loisirs fermés.

Observations :

La Belgique est le pays le mieux en capacité pour absorber la crise


<https://www.7sur7.be/belgique/pourquoi-les-perspectives-sont-meilleures-en-belgique-qu-aux-pays-bas-ou-en-espagne~a83577b0/>

3.1 Surmortalité

Le premier résultat à observer est celui du Z-Score. Cet indicateur hebdomadaire est publié par European Mortality Monitoring <https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/>

Il est basé sur une loi de Poisson pour lisser les valeurs aberrantes et les écarts de comptage et calculé en hebdomadaire pour neutraliser l'effet week-end dans les publications. Ce modèle donne un indicateur de la surmortalité par rapport au cycle chronologique habituel en tenant compte des surmortalités saisonnière. Le niveau 0 est la mortalité habituelle. La période rosée sur le graphique est celle dans laquelle les chiffres de mortalité peuvent être corrigés. (Il existe un temps de latence).

Les graphes vont du 1^{er} janvier 2020 (semaine 1) au 10 mai 2020 (semaine 19). Les NPI ont été prises en Belgique et aux Pays Bas en semaine 11 et 12.




Dans les semaines 14, 15 et 16 Nous observons que l'écart de surmortalité en Belgique est le double de la Suède. Nous observons que la surmortalité aux Pays-Bas est supérieure à la Suède.

3.2 Campagnes de dépistage et cas positifs

Courbe de croissance : nouveaux cas quotidiens par million d'habitants

Daily confirmed COVID-19 cases: are we bending the curve?



Because not everyone is tested the total number of cases is not known. Shown is the 7-day rolling average of confirmed cases.




Courbe de vitesse : accélération de l'épidémie (temps de doublement des nouveaux cas)

Total confirmed COVID-19 cases: how rapidly are they increasing?

The number of confirmed COVID-19 cases is lower than the number of total cases. The main reason for this is limited testing.





Biais d'observation :


- Plus on dépiste, plus on trouve de cas.
- Il existe un délai de latence entre l'infection et la détection positive.

Observations :


- La Belgique a dépisté deux fois plus que la Suède et trouvé deux fois plus de cas que la Suède
- Les Pays Bas dépistent au même rythme que la Suède et trouvent autant de cas, en proportion de l'écart de population entre les deux pays
- La progression des nouveaux cas est proportionnelle dans chaque pays, quel que soit leur niveau de NPI

3.3 Mortalité

Courbe de croissance de la mortalité



Courbe de vitesse : temps de doublement de la mortalité




Daily confirmed COVID-19 deaths per million, rolling 7-day average



Limited testing and challenges in the attribution of the cause of death means that the number of confirmed deaths may not be an accurate count of the true number of deaths from COVID-19.

LINEAR




Source: European CDC – Situation Update Worldwide – Last updated 7th May, 11:15 (London time)
OurWorldInData.org/coronavirus • CC BY

Taux de mortalité par cas (CFR)

Case fatality rate of the ongoing COVID-19 pandemic



The Case Fatality Rate (CFR) is the ratio between confirmed deaths and confirmed cases. During an outbreak of a pandemic the CFR is a poor measure of the mortality risk of the disease. We explain this in detail at OurWorldInData.org/Coronavirus



Source: European CDC – Situation Update Worldwide – Last updated 7th May, 11:15 (London time)
Note: Only countries with more than 100 confirmed cases are included.

CC BY

Biais d'observation sur la mortalité :

- Dans les pays observés un résultat positif au test COVID-19 n'est pas toujours requis pour qu'un décès soit enregistré comme COVID-19
- Les délais entre infection, admission en réanimation et décès signalé COVID-19 sont de 2 à 8 semaines : la mortalité au 25 avril donne une idée de la propagation entre le 25 février et le 10 avril
- Le « Case Fatality Rate » est un indicateur biaisé.
 - 1/ sous-estimation en début d'épidémie : le délai entre l'infection et le décès (supra),
 - 2/ sur-estimation au pic épidémique : le nombre de « faux-positifs » non détectés, le nombre d'immunisés par d'autres souches virales voisines ne sont pas comptabilisés. Cette distorsion accroît le sentiment de panique.
- Le taux de mortalité par l'infection « IFR » qui serait l'indicateur pertinent n'est pas calculable (supra)
- La mortalité évolue dans le temps selon la réaction immunitaire de la population, les mesures de santé publique, la capacité hospitalière.
- La « mortalité cachée » Covid 19 en Suède est évaluée à +10%, en Belgique les comptages sont plus larges qu'aux Pays-Bas et en Suède. Dans l'ensemble les comptages sont justes à +/- 10%.

Observations :

- Les dynamiques (la « forme » des courbes) sont les mêmes entre ces pays, quel que soit le volume des décès ou le niveau des mesures
- La mortalité cumulée en Belgique est supérieure aux Pays-Bas et le triple de la Suède
- Le « CFR » de la Belgique est supérieur à la Suède et aux Pays Bas
- La mortalité quotidienne en Belgique est supérieure à la Suède et aux Pays-Bas
- La mortalité par million d'habitant en Belgique est le double de celle des Pays-Bas et de la Suède

4. Discussion

Nous observons des résultats qui ne sont pas en temps réel (latence de la détection et délais de mortalité) conduisant à des NPI qui ne peuvent qu'être tardives. Nous observons un effet neutre du niveau de NPI sur la croissance des nouveaux cas et un effet pervers de surmortalité, même avec une capacité hospitalière deux fois supérieure (Belgique).

Pourquoi ?

Nous allons en discuter ci-dessous en deux points : statistiques et mathématiques

4.1 Analyse statistique : Quelle modélisation pour quels résultats réels ?

Dans cette partie nous étudions la Belgique et la Suède avec un modèle SEIR basique, comme ceux qui ont été utilisés dans diverses communications et publications. <http://gabgoh.github.io/COVID/index.html>

Nous avons conscience du caractère approximatif des paramètres et résultats. Ils n'ont pas pour objectifs d'être précis mais d'illustrer le biais avec lequel ils ont été utilisés.

Le modèle SEIR a été utilisé en prenant comme hypothèse que l'on pouvait réduire $R(0)$ par des « Non Pharmaceuticals Interventions » au sens de l'OMS. Nous reprenons les hypothèses de réduction de $R(t)$ par les NPI.

Nous modélisons un scénario moyen avec les paramètres suivants [17], [18] :

1^{er} infecté : Nous posons que le « patient 0 » est présent le 15 janvier 2020 en Belgique et en Suède (En Suède le premier cas est dépisté le 31 janvier, en Belgique le 4 février)

R_0 : 3,2

Hypothèse « total lock down » : $R(t) = R(0) - 75\%$

Hypothèse « social distancing » : $R(t) = R(0) - 25\%$

Période d'incubation : 5,8

Période infectieuse : 2,6

Taux d'hospitalisation : 11,6% (20% sur 42% de cas symptomatiques en médiane avec entre 20 (étude allemande) et 78% d'asymptomatiques (<https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1375>) même si il a été moindre en réalité (4 à 5%) [3])

Durée d'hospitalisation moyenne : 7 jours

Délai de guérison cas bénins : 8 jours

Délai avant hospitalisation : 9 jours

Délai avant mortalité : 30 jours

CFR : par pays à la date des mesures prises (celui-ci augmente naturellement à $t+$)

Basé sur les sources supra et les observations suivantes :

	Location	Reproduction Number \mathcal{R}_0	Incubation Period T_{inc} (in days)	Infectious Period T_{inf} (in days)
Kucharski et. al	Wuhan	3.0 (1.5 — 4.5)	5.2	2.9
Li, Leung and Leung	Wuhan	2.2 (1.4 — 3.9)	5.2 (4.1 — 7.0)	2.3 (0.0 — 14.9)
Wu et. al	Greater Wuhan	2.68 (2.47 — 2.86)	6.1	2.3
WHO Initial Estimate	Hubei	1.95 (1.4 — 2.5)		
WHO-China Joint Mission	Hubei	2.25 (2.0 — 2.5)	5.5 (5.0 - 6.0)	
Liu et. al	Guangdong	4.5 (4.4 — 4.6)	4.8 (2.2 — 7.4)	2.9 (0 — 5.9)
Rocklöv, Sjödin and Wilder-Smith	Princess Diamond	14.8	5.0	10.0
Backer, Klinkenberg, Wallinga	Wuhan		6.5 (5.6 — 7.9)	
Read et. al	Wuhan	3.11 (2.39 — 4.13)		
Bi et. al	Shenzhen		4.8 (4.2 — 5.4)	1.5 (0 — 3.4)
Tang et. al	China	6.47 (5.71 — 7.23)		


See [[Liu et. al](#)] detailed survey of current estimates of the reproduction number. Parameters for the diseases' clinical characteristics are taken from the following [WHO Report](#).

Discussion sur les paramètres :

On peut remettre en question tel ou tel paramètre, surtout les plus difficiles à obtenir comme les durées d’hospitalisation moyenne, de guérison cas bénins, avant hospitalisation ou avant mortalité.

Mais à l’étude on constate que ces durées n’impactent que marginalement la modélisation qui repose principalement sur $R(0)$ et $R(t)$.


Nous entrons dans le modèle les paramètres ci-dessous :




4.1.1 La Belgique

Modélisation en l'absence de NPI

En l'absence de mesures la Belgique aurait près de 300 000 hospitalisations au pic (15 avril) et 80 000 morts en cumul au 31 juillet 2020.




Modélisation avec réduction du $R(t)=R(0)-75\%$ à J+60 (lock down entre le 13 et 20 mars 2020)



Avec une NPI isolement social strict (J+60) la Belgique aurait 3 300 morts au 7 mai 2020 et 5 700 morts au 31 juillet 2020 (fin de l'épidémie).

On peut penser que la Belgique a tardé à confiner sa population, ou que sa population n'a pas suivi strictement les NPI imposées par le gouvernement. Observons l'efficacité théorique d'une NPI « total lock down » prise assez tôt :

Modélisation avec $R(t)=R(0)-75\%$ à J+35 (1^{er} décès)




Selon ce modèle, si la Belgique avait confiné sa population strictement très tôt, dès le 20 février, son bilan aurait été de 54 décès avec un pic de 112 hospitalisations.

4.1.2 La Suède


En l'absence de mesure, un scénario apocalyptique attendait la Suède ; 41 000 morts au 7 mai 2020 ; 270 000 hospitalisations et 72 000 morts au 31 juillet 2020.

Modélisation avec $R(t) = R(0)$



La Suède a pris des mesures le 16 mars dont il est fait l'hypothèse qu'elles réduisent $R(0)$ à $R(t) = R(0) - 25\%$

Modélisation avec $R(t) = R(0) - 25\%$



Elle restait dans un scénario terrifiant de 27 000 morts au 7 mai 2020, avec 211 000 hospitalisations au pic et 48 000 morts au 31 juillet 2020. Or la Suède était à 500 réanimations et 3 000 décès le 7 mai 2020.

Quel dirigeant prendrait le risque de 70 000 décès si une mesure de lock down rapide permettrait d'en avoir peut-être que quelques dizaines ?

Ces modèles tels qu'ils ont été utilisés donnent une fourchette de mortalité bien trop large. Si un modèle nous donne entre 50 décès et 80 000 décès, en fait il ne nous dit rien du tout.

De la même façon ces modèles donnaient un volume d'hospitalisations dantesque. Alors on en a déduit un $R(t)$ à obtenir pour avoir un volume d'hospitalisation que les systèmes de santé seraient capables d'absorber, et imposer en conséquence des « Non Pharmaceutical Interventions » drastiques.

L'observation de la réalité n'a, hélas pour la Belgique, la France, l'Espagne, l'Italie, et heureusement pour la Suède, rien à voir avec ces prévisions.

Alors que s'est-il passé dans l'utilisation de ces modèles pour induire la communauté scientifique et les dirigeants politiques en erreur ?

4.2 Les erreurs de méthode

Nous avons basé notre travail sur l'analyse des chiffres de la province confinée de Hubei en Chine et sur l'étude publiée par The Lancet le 29 février 2020 sur la situation en Chine [1]

Les autorités chinoises ont placé sous confinement total 56 millions d'habitants de la province de Hubei le 23 et 24 janvier 2020.

Les scientifiques publiés par « The Lancet » [1] avaient au départ prévu un pic épidémique à Wuhan pour la mi-mars « si on ne faisait rien » et modélisé la propagation avec un pic retardé au mois de mai, diminué de 50% de son ampleur si on réduisait la transmissibilité de 25%. Si on réduisait la transmissibilité à 50% on obtenait une propagation complètement écrasée. Dans leur modèle la mobilité n'avait pas d'impact sur la propagation, (ce qui est contredit par une étude du 25 mars 2020 [20]) :





Figure 4: Epidemic forecasts for Wuhan and five other Chinese cities under different scenarios of reduction in transmissibility and inter-city mobility

Cette étude estimait qu'il y avait 75 815 individus infectés à Wuhan le 25 janvier 2020 ; 1er jour du confinement. La Chine reporte 81 907 cas aujourd'hui = 6 092 cas nouveaux après le confinement.



Selon les chiffres de la NHC le pic épidémique aurait eu lieu entre le 16 - 19 février à Wuhan, mais on ne pouvait pas déjà l'observer au moment de l'étude The Lancet.

Deux remarques sont possibles :

1. Les chiffres du NHC sont tronqués (ils représentent la bonne dynamique mais pas les bonnes valeurs ni les bonnes dates)

Et / ou

2. L'hypothèse que le confinement décale le pic et le réduit en volume ne se vérifie pas

Il est possible que l'on ne soit que devant la partie émergée de l'iceberg chinois. Que l'épidémie ait commencé plus tôt, et touché plus de monde, provoquant bien plus de décès. Si le bilan chinois est minoré, les pertes seraient plus lourdes et le bilan du confinement catastrophique.

Mais les chiffres présentant une fraction de la province de Hubei donnent un panel d'observation suffisant et dégagent une dynamique claire du phénomène sur la ligne de crête. Ce graphe fait apparaître que la croissance de nouveaux cas a ralenti significativement entre le 4 et le 12 février (J+10 et J+17) avec un pic épidémique au 18 février (nombre maximum de personnes en soin).

Une erreur de mise à l'échelle

Ce qui a motivé la décision de confiner la moitié de la population mondiale, c'est l'exemple chinois de la province de Hubei confinée.

La Chine n'a pas confiné la totalité de sa population, mais une infime partie. Le confinement général de la province de Hubei a empêché que l'épidémie ne se propage dans toute la Chine : les 97% d'autres habitants. Le gouvernement chinois a demandé à 3% de sa population de sacrifier deux mois de liberté pour sauver le reste du pays.

Trois erreurs de back testing


Les modèles de propagation épidémique sont conçus pour prévoir l'évolution épidémique. Ils représentent la progression épidémique dans une population. Ils calculent le seuil d'immunisation dans une population, la vitesse de propagation, en donnant un indicateur « R » : le nombre moyen d'individus contaminés par un individu infecté. $R(0)$ au premier infecté, devient $R(t)$ à l'instant $t+$ au cours de l'évolution de la propagation. Calculer un R_0 sert à prévoir l'épidémie et organiser la réponse sanitaire ; par exemple organiser une campagne de vaccination ou mesurer l'efficacité d'un traitement. Ce R_0 varie dans le temps au fil de la propagation. [5], [6], [8], [10], [13]

- ✓ Si R_0 est supérieur à 1, l'épidémie se propage (la courbe des nouveaux cas est croissante) ;
- ✓ Si $R_0=1$ alors l'épidémie est en zone d'inflexion (la courbe des nouveaux cas est sur un « plateau ») ;
- ✓ Si $R_0 < 1$ alors l'épidémie s'éteint. (la courbe des nouveaux cas est décroissante).

On ne « contrôle » pas directement R mais certains des paramètres de son calcul comme le taux de contact entre personnes d'une population. Or dans l'utilisation qui a été faite nous avons relevé les points suivants :

1. Les modèles ont été étendus à la prévision des hospitalisations. Nous n'avons pas trouvé dans la littérature la démonstration mathématique que de tels modèles puissent donner une prévision des volumes d'hospitalisations.
2. Dans l'utilisation des modèles nous avons observé une erreur constante : la confusion entre l'indicateur R et le taux de contact.

Selon ce petit visuel et l'idée commune répandue, diviser les contacts par 4 (75% de contacts en moins) diviserait le R0 par 4 (passant de 2,5 à 0,625 personnes infectées).



Les NPI agissent sur le taux de contact, pas directement sur R. R est calculé (infra) en combinant plusieurs paramètres pour donner une indication théorique sur le stade épidémique et la vitesse de propagation, sachant qu'il tendra vers 0 en fin de cycle épidémique. L'hypothèse prise que les NPI agiraient directement sur R n'est pas valide en mathématiques (infra). On a « joué » avec l'indicateur R pour faire dire à peu près ce que l'on veut au modèle. Ce qui revient à un back test : on modélise une autre épidémie que celle qui se déroule en réalité.

3. Dans ces études, on utilise les modèles à l'envers pour définir un taux de contact hypothétique dans la population qui produise un nombre de cas que la capacité hospitalière puisse absorber. Nous sommes inquiets sur ce biais avec lequel les modèles sont utilisés. La « discipline » de la population y est « évaluée » selon des critères arbitraires, ce qui nous paraît, en soi, dangereux. On lit que les populations seraient plus ou moins « disciplinées » ici ou là, et que c'est ce degré de « discipline » qui ferait varier la charge hospitalière. On a entendu un préfet de Police déclarer que ceux qui étaient en réanimation étaient des gens qui n'avaient pas été disciplinés. Les modèles épidémiologiques n'ont pas été conçus pour évaluer le degré de « discipline » à imposer à une population en fonction d'une capacité hospitalière donnée.

Il est possible « d'accélérer » avec ces modèles (i.e. augmenter la population des immunisés par vaccination), il n'est pas démontré que l'on puisse « freiner » pour déduire un taux de contact à obtenir dans la population. Ces études sont des back tests. Et une utilisation prédictive « à l'envers » peut générer des effets pervers.

Des vies sauvées par le confinement ?

L'erreur a été poussée encore plus loin avec certaines études prétendant chiffrer le « nombre de vies sauvées » par les NPI les plus strictes. Ce qu'on prétendu faire les équipes de Neil Ferguson à l'Imperial College [3] et l'EPICX LAB [4].

Ce genre de démonstration nous semble empreint de paresse intellectuelle, voire de malhonnêteté. Comparer une situation réelle à la pire des prévisions, c'est la certitude d'avoir éternellement raison. Il y a toujours un scénario pire que le réel. C'est l'histoire de l'enfant qui rentre avec une mauvaise note et la présente comme bien meilleure que celle du dernier de la classe, sans donner ni la moyenne de la classe, ni celle du premier.

L'honnêteté intellectuelle commande de comparer les résultats obtenus par les pays et les comparer avec les prévisions de leur niveau de confinement.

- Dans le cas de la Belgique, le bilan du confinement ne tient pas l'objectif qui était de limiter à 3300 décès au 7 mai. Ce jour-là il y a presque 3 fois plus que ce qui était espéré par le niveau de confinement de la Belgique.
- Dans le cas de la Suède, a contrario, il y a moins de décès que ce qui était attendu par son niveau de NPI : 3000 vs 27000. Presque 10 fois moins.

Dans les deux cas, les prévisions n'étaient pas valables.

On le voit, l'utilisation de ces modèles, sous pression dans un temps de crise, s'est éloigné à grande vitesse de la rigueur scientifique. Dans la partie suivante nous allons étudier les erreurs mathématiques qui ont conduit à ces effets pervers indésirables de surcharge hospitalière et de surmortalité constatés en Belgique dans nos résultats.

4.3 Analyse mathématique : un effet pervers sur le taux de guérison

Les modèles de propagation épidémique sont en mathématiques assez semblables aux autres modèles connus et utilisés dans l'ingénierie que nous avons pratiqués avec nos équipes pendant des années ; par exemple les modèles de propagation d'ondes radio, les modèles financiers, sont autant d'outils du quotidien pour calculer et prévoir. On y retrouve les mêmes bases mathématiques : calculs stochastiques, équations différentielles complexes, etc. Ainsi d'autres que nous ont investi le champ de la propagation épidémique, dans une approche classique. Ce sont d'abord des statistiques et des mathématiques, ensuite appliquées en épidémiologie. [11], [12]

Nous remarquerons que les modèles utilisés dans d'autres disciplines n'ont pas droit à l'erreur. Un ingénieur des ponts et chaussées qui utilise mal un modèle et l'ouvrage s'effondre. Un ingénieur télécommunications qui fait une erreur de calcul et le réseau tombe. Un ingénieur financier qui se trompe dans un stress test et la banque est ruinée. Certaines équipes d'ingénierie et de recherche ignorent la sanction du feu. Si leur modèle est faux, ils ne perdront pas leur budget ni leur emploi. Ainsi l'épidémiologie descriptive, une discipline non médicale, statistique, jusqu'ici n'était pas exposée à la cruauté du réel.

A la suite de la lecture de l'étude de The Lancet [1], nous avons effectué la démonstration que l'hypothèse de l'efficacité des mesures de confinement général pose une erreur de raisonnement mathématique.

1. **Hugo Falconet et Antoine Jego** ont introduit sous la direction d'Amandine Veber et Vincent Calvez (Ecole Normale Supérieure) en 2015 [4] la relation proportionnelle entre le taux de contact et le taux de guérison.

Taux de contact (TC): pour une personne le nombre de contacts sur une période

Taux de guérison (TG) : pour une population, le nombre de guéris vs le nombre de malades sur une période.

Pour simplifier la démonstration, considérons une population à l'équilibre avec taux de mortalité = taux de natalité et une infection non létale qui ne produit aucun décès. Les individus sains et infectés sont en contact et guérissent selon un taux de contact et un taux de guérison. Cette relation proportionnelle s'écrira alors :

$$R0 = \frac{TC}{TG}$$

Autrement dit $TC = R0 \times TG$

Si par une NPI on opère $TC / 4$ alors on a $R0 \times TG / 4$.

Ce que dit la formule $R0 = TC / TG$ c'est que diviser par 4 le taux de contact divise par 4 le produit de $R0$ par le taux de guérison.

Ce qui signifie que dans l'hypothèse d'un $R0 = 2,5$ et d'une NPI de confinement strict divisant le taux de contact par 4 pour obtenir un $R0 = 0,625$ alors on a divisé par 1,6 le taux de guérison. Si $R0 = 2,5 / 4$ alors $TG / 1,6$.

Diviser le taux de guérison par 1,6 correspond a minima, en réajustant à la marge avec les taux de mortalité et de natalité habituels, à l'écart de mortalité et surmortalité observée entre la Belgique et la Suède (cf supra).

Avec une diminution des contacts, on diminue le taux de guérison on obtient un effet pervers : la surcharge des hôpitaux et l'augmentation des décès.

Lorsque le CMMID COVID-19 working group évalue l'impact de la diminution du taux de contact sur le nombre reproducteur R il fait l'impasse sur l'impact que ce taux de contact peut avoir sur le taux de guérison. [19]

2. **Kermack et McKendrick** [7], [11], [12] ont démontré que R_0 est le produit de la probabilité de transmission par contact (PT), du taux de contact par période (TC) et de la période contagieuse (PC).

$$R_0 = PT * TC * PC$$

Autrement dit, dans cette formule, pour pouvoir écrire $R_0/4$ il faut :

- Diviser la période contagieuse par 4
- Diviser le taux de contact par 4 avec le risque de diminuer le taux de guérison (cf. supra)
- Diviser la probabilité de transmission par 4 : on ne sait pas faire, même si la probabilité de transmission est proportionnelle au taux de contact [15]

Mais on peut diminuer la probabilité de transmission en divisant la population en différents compartiments chacun avec une probabilité de transmission différente, moins élevée que la probabilité globale.

Le modèle de base SI peut être affiné avec plus de compartiments : R pour les Rétablis, E pour les individus exposés, Q pour les quarantaines, M pour les immunisés de naissance, C pour les porteurs asymptomatiques et on subdivise I selon les différentes charges virales nécessitant divers traitements. Les individus passent d'un compartiment à l'autre selon des paramètres comme le taux de contact, le taux de guérison, la probabilité de transmission, le taux de contagion, la météo, le comportement des populations (gestes barrières, etc.) Par exemple à l'échelle de la Chine, on a créé un compartiment Q géant, la province de Hubei. Chaque compartiment obéit à des règles : par ex les individus E portent un masque ou sont confinés. Les individus I portent un masque, sont hospitalisés ou sont confinés, selon leur charge virale. Les individus S portent un masque ou pas. Chaque compartiment est affecté d'une probabilité de transmission différente. Par exemple les individus du compartiment Q en quarantaine ont une probabilité de transmission très basse. Les individus M également. Les individus E et C ont une probabilité plus élevée qui peut être limitée par les mesures barrière (masques).

C'est cette formule qui a été appliquée en Corée du Sud, à Taïwan, à Hong Kong et Singapour.

3. **Van den Driessche et Watmough** [14] précisent que dans le cas d'un seul compartiment infecté, $R(0)$ est simplement le produit du taux d'infection et de sa durée moyenne. Donc si on a un confinement général on réduit à un compartiment la population et l'épidémie se propage selon son rythme à partir de $R(0)$. Dans cette formule, le confinement général revient à aucun confinement.

C'est contre intuitif mais ces trois formules mathématiques expliquent les bons chiffres des pays non confinés et compartimentés vs les pays simplement confinés (province de Hubei, Italie, Espagne, France, etc.)

Nous ne savons pas donner d'explications médicales, mais peut-être faut-il étudier l'impact d'un confinement strict sur les systèmes immunitaires de la population, ou encore l'impact d'un confinement sur le taux de guérison marginal de populations à risques. Par exemple en France les EHPAD connaissent une hécatombe. C'est qu'ils sont confinés mais ensemble, comme les passagers du Diamond Princess. Le taux de contact global baisse au niveau de la population, mais pas dans des populations marginales exposées au risque. Le taux de guérison global s'en ressent.

5. Conclusion

La conclusion est contre - intuitive, heurte les idées reçues, et touche les ressorts profonds de la psychologie collective. Plus un investissement est massif, et plus la tendance est d'investir encore. Plus un sacrifice a été important, plus il est difficile d'admettre qu'il était inutile. Quel aurait été le sort de ceux qui auraient tenté d'expliquer aux Incas que leurs sacrifices n'ont aucune influence sur la course du soleil ? Nous restons modestes mais renforcés dans notre conviction (depuis 9 semaines maintenant). Le confinement général strict et indifférencié n'a aucun impact notable et peut même avoir des effets indésirables.

1. A défaut de mesures préventives rapides, l'absence de confinement (Suède) donne globalement des résultats meilleurs qu'un confinement strict, avec un coût économique et social bien moindre.
2. Un confinement souple (Pays-Bas) donne des résultats voisins de l'absence de confinement (Suède)
3. Le confinement général, strict et indifférencié, malgré un système sanitaire 2 fois plus important, réalise un effet pervers sur le taux de guérison marginal : surcharge hospitalière et augmentation des décès. Le contraire de l'effet imaginé.
4. Le raisonnement selon lequel le confinement général strict et indifférencié influe directement sur le « R_0 » de propagation épidémique est faux. Une mesure de confinement général strict et indifférencié n'impacte pas directement le R_0 mais l'un de ses paramètres : le taux de contact.
5. Les modélisations mathématiques et statistiques ont été basées sur des « hypothèses » non scientifiques et un dévoiement des modèles :
 - ✓ Utilisation de $R(0)$ comme un paramètre alors qu'il est un indicateur,
 - ✓ Appréciation à l'estime d'un niveau de « discipline » de la population,
 - ✓ Choix arbitraire de l'impact sur $R(t)$,
 - ✓ Un modèle « tordu » dans lequel on modifie $R(t)$ à un instant t par une « Non Pharmaceutical Intervention »,
 - ✓ Une prévision des hospitalisations non démontrée,
 - ✓ Du back testing mais pas de modélisation prédictive.

La course à une communication scientifique en temps réel, avec des équipes de plus en plus nombreuses, hiérarchisées, outillées et internationalisées devient de plus en plus homogène dans sa production. Focalisées sur les mêmes sujets avec les mêmes approches, les scientifiques modernes peuvent reproduire à l'infini les mêmes biais. La science encyclopédique classique des anciens, ouverte à la réfutation, pluri disciplinaire, doit-elle redevenir la norme ?

Nous devons ici rendre un hommage appuyé à la Suède. Sans ce choix courageux d'une autre voie, plus conforme aux droits humains et à la prudence scientifique devant des prévisions plus incertaines que l'épidémie elle-même, jamais nous n'aurions pu avoir de comparaison en temps réel et se faire une idée juste. Il faudra garder longtemps à l'esprit ce qui était dit partout dans le monde au sujet de ce choix suédois dans cette deuxième quinzaine du mois de mars 2020.

Les auteurs :

Gilles PECH de LACLAUSE,

Master en Administration Publique, Saint-Cyrien,

A dirigé son cabinet de conseil et d'ingénierie pendant 10 ans où il a dirigé les travaux d'équipes d'ingénieurs dans les domaines de la modélisation financière ou les études de radiocommunications.

Intervenant auprès de business schools (ESSEC, HEC, NEOMA, etc.) Il conseille entreprises et collectivités.

<https://www.linkedin.com/in/gillespech/>

Arnaud DELEND

Docteur en Mathématiques appliquées à l'informatique (Ecole Polytechnique et Université Rennes 1), Master Dauphine-Ecole Polytechnique en 2000, a enseigné l'économétrie en master à l'Université Paris II, en licence à l'Université Paris Dauphine. Expert en modélisation mathématique, optimisation et théorie de jeux.

https://www.academia.edu/1278713/Reserve_price_in_progressive_second_price_auctions

Dans le secteur privé, il a été ingénieur recherche & développement chez France Telecom, Manager pour Simon Kucher & Partners et Accenture. Aujourd'hui, conseille les entreprises de tailles intermédiaires, startup, et les grands groupes.

<https://www.linkedin.com/in/delenda/>

Nous avons pris position dès le 22 mars contre cette mesure, et publié quasi quotidiennement nos analyses à partir du 23 mars 2020 sur le réseau professionnel « LinkedIn »

23 mars 2020 : <https://www.linkedin.com/posts/activity-6647774509065744384-It8a>

26 mars 2020 : https://www.linkedin.com/posts/activity-6648891516578340864-Gp_b

30 mars 2020 : <https://www.linkedin.com/posts/activity-6650424289491333122-ZOnR>

2 avril 2020 : <https://www.linkedin.com/posts/activity-6651513253778325505-HA61>

9 avril 2020 : <https://www.linkedin.com/posts/activity-6653930736250433537-r3pg>

14 avril 2020 : <https://www.linkedin.com/posts/activity-6655762211346231296-nwTw>

17 avril 2020 : <https://www.linkedin.com/posts/activity-6656906144008810496-KYxy>

24 avril 2020 : <https://www.linkedin.com/posts/activity-6659395424258011136-ovyq>

29 avril 2020 : <https://www.linkedin.com/posts/activity-6661190622776569856-fxsr>

Chaque publication était vue par en moyenne un millier de lecteurs, parfois plus de 5000 (14 avril) interagissant avec un public averti et de nombreux experts médicaux, statisticiens, mathématiciens.

Plusieurs universitaires ont abouti, dans leurs domaines respectifs, à des conclusions voisines reprises dans la presse.

Knut M. Wittkowski former Head, Biostatistics, Epidemiology, and Research Design, Center for Clinical & Translational Science

https://www.spiked-online.com/2020/05/15/we-could-open-up-again-and-forget-the-whole-thing/?fbclid=IwAR0mky6vTA-9T8ODDv7nHxF5LIHVMhB_-Z-eesykwH2InQPGtIS-g3tY85Y#.Xr_745ceU-A.facebook

Paul W Franks, Epidemiologiste, Lund University

<https://theconversation.com/immunité-collective-contrairement-aux-pays-confinés-la-suede-serait-pres-dy-arriver-137192>

<https://theconversation.com/la-suede-est-tres-relax-face-au-coronavirus-voici-la-science-derriere-cette-decision-135018>

Jean-Dominique MICHEL, Anthropologue, Institut de hautes études internationales et du développement (Genève), Université de Lausanne et EPFL, Université de Neuchâtel, Université de Montréal, Université de Genève, faculté de médecine, Université de Fribourg et Haute école de gestion de Neuchâtel, Haute Ecole de Santé (Lausanne), San Diego State University (USA), College of Nursing Coimbatore (Inde), Jiangnan University & PolyU, Hong Kong (Chine), Institut d'Etudes Sociales, Genève, Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques, Lausanne, Haute Ecole Santé Social, Givisiez, Fribourg, Ecole de soins infirmiers Bois-Cerf, Lausanne, Centre de formation des Hôpitaux Universitaires de Genève.

<http://jdmichel.blog.tdg.ch/>

Professeur Isaac BEN-ISRAEL, Président de l'Agence spatiale israélienne et du Conseil national pour la recherche et le développement, membre du conseil d'administration de Israel Corp .; du conseil consultatif de recherche et développement de Teva Pharmaceutical Industries; du Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies; du conseil consultatif du Neaman Institute for Advanced Studies in Science and Technology du Technion; du conseil académique du Tel-Aviv Academic College of Engineering; du Centre interdisciplinaire d'analyse et de prévision technologiques (Tel-Aviv Univ.); et du Comité national pour les technologies de la société de l'information. En 2003, il a fondé RAY-TOP (Technology Opportunities) Ltd., une société de conseil en défense. Ancien chef de la division Analyse et évaluation de la Direction de la recherche opérationnelle de la Direction du renseignement aérien de la Force aérienne israélienne. Ancien membre du conseil d'administration d'Israel Aircraft Industries.

<https://www.timesofisrael.com/the-end-of-exponential-growth-the-decline-in-the-spread-of-coronavirus/>

Vincent LABORDERIE, politologue, UCL Louvain <https://uclouvain.be/fr/repertoires/vincent.laborderie>

<https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/vincent-laborderie-plaide-pour-un-confinement-moins-restrictif/10220874.html>

<https://www.rtl.be/info/belgique/societe/coronavirus-en-belgique-une-etude-de-l-ucl-recommande-la-fin-du-confinement-1212172.aspx>

Jocelyn RAUDE, psychologue social, EHESP Rennes

<https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-la-peur-d-une-epidemie-n-est-pas-proportionnelle-au-nombre-de-morts-6782011>

<https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/jocelyn-raude-on-n-est-pas-fait-pour-vivre-en-isolement-16-04-2020-12539975.php>

Bibliographie

- [1] Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study Joseph T Wu, Kathy Leung, Gabriel M Leung. *The Lancet*, 29 février 2020.
- [2] Estimating the number of infections and the impact of nonpharmaceutical interventions on COVID-19 in 11 European countries 30 March 2020 Imperial College COVID-19 Response Team; Neil M. Ferguson and Samir Bhatt
- [3] Expected impact of lockdown in Île-de-France and possible exit strategies Laura Di Domenico¹, Giulia Pullano^{1,2}, Chiara E. Sabbatini¹, Pierre-Yves Boëlle¹, Vittoria Colizza^{1,*} 12/04/2020
- [4] « Modéliser la propagation d'une épidémie » Hugo Falconet et Antoine Jego sous la direction d'Amandine Veber et Vincent Calvez, Juin 2015
- [5] G. Sallet INRIA & IRD EPICASA, 09 avril 2010
- [6] L. Pellis, F. Balle and P. Trapman, Reproduction numbers for epidemic models with households and other structures., *Mathematical Biosciences*, 13 (2012)
- [7] M. C. de Jong, O. Diekmann, and H. Heesterbeek, The legacy of Kermack and McKendrick., in *Epidemic models. Their structure and relation to data*, D. Mollison, ed., Cambridge University Press, 1995.
- [8] O. Diekmann, J. A. P. Heesterbeek, and J. A. J. Metz, On the definition and the computation of the basic reproduction ratio R_0 in models for infectious diseases in heterogeneous populations, *J. Math. Biol.*, 28 (1990).
- [10] The estimation of the basic reproduction number for infectious diseases, *Statist. Meth. Med. Res.*, (1993).
- [11] W. Kermack and A. McKendrick, A contribution to the mathematical theory of epidemics, *Proc. R. Soc.*, A115 (1927).
- [12] W. O. Kermack and A. G. McKendrick, Contributions to the mathematical theory of epidemics–i. 1927., *Bull Math Biol*, 53 (1991).
- [13] J. A. P. Heesterbeek, A brief history of R_0 and a recipe for its calculation, *Acta Biotheorica*, 50 (2002).
- [14] P. van den Driessche and J. Watmough, reproduction numbers and sub-threshold endemic equilibria for compartmental models of disease transmission, *Math. Biosci.*, 180 (2002).
- [15] Henrik Salje, Cécile Tran Kiem, Noémie Lefrancq, Noémie Courtejoie, Paolo Bosetti, et al.. Estimating the burden of SARS-CoV-2 in France. 2020. [pasteur-02548181](https://doi.org/10.1101/2020.03.03.20029983)
- [16] J. Wang, K. Tang, K. Feng, W. Lv, High Temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19. *SSRN Electronic Journal*, , doi:10.2139/ssrn.3551767.
- [17] N. M. Linton, T. Kobayashi, Y. Yang, K. Hayashi, A. R. Akhmetzhanov, S.-M. Jung, B. Yuan, R. Kinoshita, H. Nishiura, Incubation Period and Other Epidemiological Characteristics of 2019 Novel Coronavirus Infections with Right Truncation: A Statistical Analysis of Publicly Available Case Data. *Journal of Clinical Medicine*. 9 (2020).
- [18] L. Tindale, M. Coombe, J. E. Stockdale, E. Garlock, W. Y. V. Lau, M. Saraswat, Y.-H. B. Lee, L. Zhang, D. Chen, J. Wallinga, C. Colijn, Transmission interval estimates suggest pre-symptomatic spread of COVID-19. *Epidemiology* (2020), doi:10.1101/2020.03.03.20029983.
- [19] C. I. Jarvis, K. Van Zandvoort, A. Gimma, K. Prem, CMMID COVID-19 working group, P. Klepac, G. J. Rubin, W. J. Edmunds, Quantifying the impact of physical distance measures on the transmission of COVID-19 in the UK. *Epidemiology* (2020), , doi:10.1101/2020.03.31.20049023.
- [20] Science. 2020 Mar 25 : eabb4218. Published online 2020 Mar 25. doi: 10.1126/science.abb4218 PMID: PMC7146642 PMID: 32213647 The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China